

ที่ กษ ๐๖๑๐.๐๒ / ว ๑๕๐๒๓

กรมปศุสัตว์

ถนนพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒

เรื่อง เช้มนวดการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดสุกร (Swine Influenza)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง หนังสือที่ กษ ๐๖๑๐.๐๒/ว ๙๒๗๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข่าวประชาสัมพันธ์กรมปศุสัตว์

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมปศุสัตว์ได้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดสั่งการให้ปศุสัตว์จังหวัดดำเนินการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดสุกรทางห้องปฏิบัติการเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสดังกล่าวไปแล้ว นั้น จากการที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศยกระดับเตือนภัยการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1) เป็นระดับ ๖ คือ มีการระบาดติดต่อจากคนสู่คนแพร่กระจายไปทั่วโลก ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์ถึงแม้ความรุนแรงของโรคจะไม่รุนแรงแต่มีแนวโน้มที่จะพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับมีหลักฐานทางวิชาการพบว่าเชื้อไข้หวัดใหญ่สามารถติดต่อกับสุกรและอาจเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมในตัวสุกรแล้วติดต่อกลับสู่คนได้อีก ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ เชื้อไข้หวัดใหญ่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคและควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย

กรมปศุสัตว์ จึงมีความจำเป็นต้องขอแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดในประเทศไทย จึงให้ปศุสัตว์จังหวัดเร่งรัดดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้


๑. ประสานงานสาธารณสุขจังหวัดให้แจ้งปศุสัตว์จังหวัดด้วย กรณีที่พบผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1) ซึ่งผู้ป่วยนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสุกรเพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคและลดโอกาสที่เชื้อไข้หวัดใหญ่จะแพร่ไปยังสุกร
๒. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ติดต่อกับคนสู่สุกรตามแนวทางที่กรมปศุสัตว์ได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
๓. ติดต่อกำนักสัตวศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยขอเบิกแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ติดต่อกับคนสู่สุกรนำไปติดตั้งที่หน้าฟาร์มสุกร หรือหน้าคอกสุกรรายย่อยทุกแห่ง

๔. เก็บตัวอย่าง ...

๔. เก็บตัวอย่าง Nasal Swab สุ่มตามโครงการติดตามและเฝ้าระวังโรคไขหวัดสุกรในปี ๒๕๕๒ ให้ได้จำนวนตัวอย่างครบถ้วนตามเป้าหมาย ซึ่งขณะนี้ผ่านช่วงเวลาสิ้นสุดการเก็บตัวอย่างแล้ว ทั้งนี้จะดำเนินโครงการติดตามและเฝ้าระวังโรคไขหวัดสุกรในปี ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๒ ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๕๒ โดยกรมปศุสัตว์จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการให้ปศุสัตว์จังหวัดดำเนินการต่อไป จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ


อ.ดร. ลิมแหลมทอง

(นายชุกล ลิมแหลมทอง)
อธิบดีกรมปศุสัตว์

สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๔๑๒๑

โทรสาร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๙๒๐



ข่าวปศุสัตว์

สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๔๑๒๑ โทรสาร ๐ ๒๖๕๓ ๔๘๖๒

การป้องกันการติดต่อโรคไข้หวัดใหญ่จากคนสู่สุกร

ตามที่มีรายงานการติดต่อของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ จากคนไปยังสุกรในประเทศแคนาดา ประกอบกับหลักฐานทางวิชาการพบว่าเชื้อไข้หวัดใหญ่สามารถแลกเปลี่ยนพันธุกรรมระหว่างสุกรและคนได้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำความเข้าใจให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับโรคไข้หวัดสุกรและการป้องกันโรคไข้หวัดสุกร ที่ถูกต้อง ดังต่อไปนี้

๑. อาการของผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่โดยทั่วไป มีดังนี้

- ไอแห้ง ๆ อย่างรุนแรง มีน้ำมูกใส หน้าแดง ตาแดง ปวดรอบตา มีไข้สูง ๓๙ - ๔๐ องศา
- หนาวสั่นปวดเมื่อยทั้งตัว เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อ่อนเพลียมาก รายที่เป็นรุนแรงอาจถึงขั้นปอดบวม
- สำหรับคนที่มีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันโรคดี อาการอาจเพียงคล้ายไข้หวัดธรรมดา แต่สามารถ

ที่จะแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้

๒. การแพร่เชื้อไข้หวัดใหญ่

เชื้อจะถูกขับออกมาทางเสมหะ น้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย แพร่ไปยังผู้อื่นหรือสัตว์ โดยการไอหรือจามรดกัน ในระยะใกล้ชิดหรือติดจากมือและสิ่งของที่สัมผัสปนเปื้อนอยู่

๓. การป้องกันการติดต่อโรคไข้หวัดใหญ่จากคนสู่สุกร

๓.๑ ข้อปฏิบัติของผู้เลี้ยงสุกรหรือผู้ที่เข้าฟาร์มสุกรหรือคอกสุกร

๑) หากมีอาการป่วยเป็นไข้หวัด หรือมีอาการป่วยด้วย โรคทางเดินหายใจ ห้ามเข้าในฟาร์มสุกร หรือคอกเลี้ยงสุกรเด็ดขาด จะเข้าได้ก็ต่อเมื่อหายจากอาการป่วยแล้วอย่างน้อย ๗ วัน

๒) ห้ามคลุกคลี และสัมผัสกับผู้ที่มีอาการป่วย ด้วยโรคไข้หวัดหรือมีอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ หากจำเป็นต้องไปคลุกคลีหรือสัมผัสกับผู้ป่วยดังกล่าว ให้งดการเข้าภายในฟาร์ม หรือ คอกเลี้ยงสุกรอย่างน้อย ๕ วัน

๓) ต้องทำความสะอาด จุ่มรองเท้าและล้างมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ก่อนเข้าฟาร์ม หรือคอกเลี้ยงสุกรทุกครั้ง

๓.๒ ทำความสะอาดรถที่เข้า-ออกฟาร์ม และอุปกรณ์ที่ใช้ภายในฟาร์มด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง

๓.๓ ห้ามบุคคลภายนอก เช่น คนส่งอาหารสัตว์ คนรับซื้อสุกร พนักงานขายยาและอาหารสัตว์ที่มีอาการป่วยหรือมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยเข้าภายในฟาร์ม

๓.๔. หากพบสุกรที่มีไข้ ซึม น้ำหนักลด หายใจลำบาก ไอ จาม น้ำมูกไหลมากกว่า ๕๐% ในฝูง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทราบ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์ได้ทำโครงการติดตามเฝ้าระวังโรคไข้หวัดสุกรในประเทศไทย เพื่อสำรวจสถานะโรคและศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสดังกล่าว เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๒ ปัจจุบันผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ มีดังนี้

๑. การเฝ้าระวังโรคทางอากาศ โดยใช้เครือข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในพื้นที่ เฝ้าระวังและรับแจ้งชาวสุกรป่วย ยังไม่พบสุกรแสดงอาการป่วยด้วยโรคไข้หวัดสุกรแต่อย่างใด
๒. การเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ โดยสุ่มเก็บตัวอย่างสิ่งคัดหลั่งในโพรงจมูกสุกรในฟาร์มและ ซากสุกรในโรงฆ่าสัตว์ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น ๒๔,๓๐๐ ตัวอย่าง เก็บตัวอย่างแล้ว ๑๒,๔๐๖ ตัวอย่าง คิดเป็น ๕๑.๐๕ เปอร์เซ็นต์ ตรวจไม่พบเชื้อไข้หวัดสุกรแต่อย่างใด

ข้อมูล / ข่าว สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์