

แนวทางการให้ข่าวของเจ้าหน้าที่

๑. อธิบายที่มาของการเกิดโรคระบาด ดังนี้

ตามที่มีรายงานข่าวการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ในคน ที่ประเทศเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกา โดยพบผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยว่าติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ในทั้ง ๒ ประเทศ โดยจำนวนที่สงสัยนี้บางส่วนได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัส ชนิด H1N1 ที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเปลี่ยนไปและการเกิดโรคดังกล่าวในทั้ง ๒ ประเทศนี้เป็นการระบาดจากคนไปสู่คน และยังไม่พบการระบาดจากสุกรสู่คนแต่อย่างใด

๒. อธิบายแนวทางการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกันโรค Swine Influenza ของกรมปศุสัตว์ ดังนี้

๒.๑ แจ้งปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอเพื่อเฝ้าระวังโรคในสุกร หากมีสุกรป่วยหรือตายผิดปกติให้เจ้าของสัตว์แจ้งสัตวแพทย์เพื่อเข้าชันสูตรหาสาเหตุการป่วยและตายต่อไป

๒.๒ กรมปศุสัตว์ได้ประกาศงดการนำเข้าสุกรมีชีวิต และซากสุกรจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ที่มีรายงานของโรคดังกล่าว

๒.๓ กรมปศุสัตว์ได้ประสานสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ แจ้งให้สมาชิกมีการเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มงวด

๒.๔ ในส่วนการเคลื่อนย้ายสุกรมี่ชีวิตและซากสุกร ขณะนี้ยังสามารถเคลื่อนย้ายได้ตามปกติ เพราะสุกรมี่ชีวิตและซากสุกรมาจากฟาร์มที่ผ่านการรับรองจากกรมปศุสัตว์และผ่านการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และกักเก็บซากสัตว์เอกชน นอกจากนี้ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์จะมีสัตวแพทย์ไปตรวจสอบสุขภาพและสุขอนามัยก่อนอนุญาตให้เคลื่อนย้าย

๓. แนะนำเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรดังนี้

การป้องกันโรค

๓.๑. ให้มีการสุขาภิบาลการเลี้ยงสุกรที่ดี

- ทำคอกให้สะอาด ไม่ชื้นแฉะ มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
- สุกรไม่อยู่ในที่หนาวเย็น ร้อนหรือถูกฝนมากเกินไป
- ให้อาหารที่มีคุณภาพ ถูกสัดส่วน และสะอาด รวมทั้งเสริมวิตามินในอาหารสุกรเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์และลดความเครียดของสัตว์
- เข้มงวดตรวจสอบให้นำสุกรที่ปลอดโรคเข้าเลี้ยงในฟาร์ม
- เข้มงวดการเข้าออกฟาร์มของบุคคลและยานพาหนะ โดยใช้น้ำฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ
- เกษตรกรควรปรับระบบการเลี้ยงให้เข้าสู่ระบบฟาร์มมาตรฐาน ซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดโรคระบาดและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุกรที่มีคุณภาพตามความต้องการของ

ตลาด ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้เลี้ยงสุกรและผู้บริโภค โดย
เกษตรกรติดต่อรายละเอียดการจัดทำมาตรฐานฟาร์มได้ที่ปศุ
สัตว์อำเภอในพื้นที่หรือปศุสัตว์จังหวัด

๓.๒ สังเกตอาการป่วยของสุกรในฝูงอย่างสม่ำเสมอ โดยอาการของสุกร
ที่ป่วยด้วยโรคไข้หวัดสุกรจะแสดงอาการมีไข้ ซึม เบื่ออาหาร ไอจาม
น้ำมูกไหล หากพบอาการดังกล่าวให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทราบภายใน
๒๔ ชั่วโมง

๓.๓ หลีกเลี่ยงการเลี้ยงสัตว์ปีกในบริเวณเดียวกับที่เลี้ยงสุกร เพื่อลด
โอกาสที่จะเกิดการรวมพันธุกรรมระหว่างเชื้อไวรัส ไข้หวัดนก และ
ไข้หวัดสุกร

๓.๔ ห้ามผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินหายใจ เช่น เป็นหวัด ไอจาม เข้าใน
คอกเลี้ยงสุกร หากผู้เลี้ยงสุกร

หรือผู้ที่สัมผัสสุกรมีอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ ให้รีบไปพบ
แพทย์ทันที

การควบคุมโรค

- สุกรที่แสดงอาการป่วยให้รักษาตามอาการเช่นฉีดยาปฏิชีวนะหรืออาจ
ต้องให้สารน้ำหากจำเป็น ส่วนสุกรที่เลี้ยงร่วมฝูงให้ยาปฏิชีวนะ โดยผสม
ยาให้สุกรกิน เพื่อลดการแทรกซ้อนของเชื้อแบคทีเรียตามคำแนะนำของ
สัตวแพทย์

- ใช้ยาม่าเชื้อทำความสะอาดคอก เช่นกลุ่มกลูตารอลดีไฮด์ กลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์ กลุ่มไอโอดีน โดยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจาย ซึ่งเชื้อไวรัสตัวนี้นอกจากจะถูกทำลายได้ง่ายด้วยยาม่าเชื้อโรคแล้ว ยังสามารถทำลายด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ ๕๖ องศาเซลเซียส นาน ๓ ชั่วโมง หรือ ๖๐ องศาเซลเซียส นาน ๓๐ นาที
- งดการเคลื่อนย้ายสุกรหรือสับเปลี่ยนคอกในช่วงที่พบการเกิดโรค เนื่องจากอาจทำให้โรคแพร่กระจายได้ง่าย

๔. สิ่งสำคัญขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก เพราะโรคไขหวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่พบในเม็กซิโกยังตรวจไม่พบในประเทศไทยและยังสามารถบริโภคเนื้อสุกรได้โดยปรกติ และเนื้อสุกรต้องมาจากแหล่งที่กรมปศุสัตว์รับรองและขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง หมั่นออกกำลังกาย กินอาหารที่มีประโยชน์ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร

