

# การจัดการอาหารหยาบในช่วงฤดูแล้ง



สมพร โชคเจริญ

สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี

## รูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทย

\* ฤดูฝน -หญ้าสด

\* ฤดูแล้ง-ใช้ฟาง

-หญ้าแห้ง

-หญ้าหมัก

-ผลพลอยได้ทางการเกษตร

หญ้าหมัก -เป็นการเก็บหญ้าในสภาพสด  
-ไว้ในสภาพไม่มีอากาศ  
- คุณภาพดี ความน่ากินสูง

หญ้าแห้ง -เป็นการเก็บหญ้าในสภาพแห้ง  
-โดยการระเหยน้ำออกโดยตากแดด  
- เก็บเป็นฟ่อน หรือกองรวมกัน

## ฟางปรุขแต่ง

- เป็นการนำฟางข้าว น้ำ ปุ๋ยยูเรียมา  
หมักร่วมกันนานประมาณ 15-20 วัน (2-3  
สัปดาห์)

- ยูเรียจะช่วยทำให้ฟางมี % โปรตีน  
สูงขึ้น และมีการย่อยได้ที่สูงขึ้น

## บ่อหมักฟาง

-ขนาด 2\*6\*1.2 เมตร

-จุได้ประมาณ 1 ตัน

## ส่วนผสม

-ฟางข้าว 100 กก.

-น้ำ 100 กก. (100 ลิตร)

-ปุ๋ยยูเรีย 5 หรือ 6 กก.

## อุปกรณ์อื่น ๆ


- บั้วรดน้ำ

- เครื่องชั่ง

- พลาสติกหน้ากว้าง (ใสหรือทึบ)

- ภาชนะใส่น้ำ หรือโอ่ง

หลุมหมัก




1.2

2

6

พลาสติก



ฟอง+น้ำ+ยูเรีย

## การนำไปใช้

- ยูเรีย 5 % หมัก 2 สัปดาห์
- ยูเรีย 6 % หมัก 3 สัปดาห์
- ฝังลมหั้หมดกลิ่นแอมโมเนีย  
ก่อนให้กิน
- เปิดไป ๆ เท่าที่กินได้ในแต่ละวัน

## คุณค่าทางอาหาร

ส่วนประกอบ	ฟาง ธรรมดา	5% ยูเรีย	6% ยูเรีย
นน.แห้ง	89	53	57
โปรตีน	2.9	5.3	8.1
การย่อยได้	47	56	54