

## โปรแกรมการใช้วัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีก

### โปรแกรมวัคซีนสำหรับเป็ดและห่าน

อายุ	วัคซีนที่ใช้	
	กาฬโรคเป็ด	อหิวาต์เป็ด-ไก่
3-4 สัปดาห์	✓	
8 สัปดาห์		✓
10-12 สัปดาห์	✓	✓
ทุกๆ 3 เดือน		✓
ทุกๆ 6 เดือน	✓	
วิธีให้	ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ	ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ/ใต้ผิวหนัง

ที่มา: สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

### โปรแกรมวัคซีนสำหรับไก่ไข่ ไก่พันธุ์ และไก่พื้นเมือง

อายุ	วัคซีนที่ใช้				
	อหิวาต์เป็ด-ไก่ (FC)	นิวคาสเซิลเชื้อเป็นสเตรนลาโซต้า (NDL)	หลอดลมอักเสบติดต่อฯ (IB)	ฝีดาษไก่ (FD)	ND+IB
7-10 วัน		✓	✓		✓
3-4 สัปดาห์		✓	✓		✓
5 สัปดาห์				✓	
6-8 สัปดาห์		✓	✓		✓
8 สัปดาห์	✓				
1 สัปดาห์	✓				
ทุก 3 เดือน	✓	✓	✓		✓
วิธีใช้	ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ/ใต้ผิวหนัง	หยอดตา/จุ่ม	หยอดตา/จุ่ม	แทงปีก	หยอดตา/จุ่ม

ที่มา: สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

**หมายเหตุ :** - ให้ใช้วัคซีนหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่และนิวคาสเซิลเชื้อเป็นสเตรนลาโซต้า หรือใช้วัคซีนรวมนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบติดต่อ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

## โปรแกรมวัคซีนสำหรับไก่เนื้อ

อายุ	วัคซีนที่ใช้		
	หลอดลมอักเสบติดต่อกัน	นิวคาสเซิลเชื้อเป็น สเตรนลาโซต้า	วัคซีนรวมนิวคาสเซิลและ หลอดลมอักเสบติดต่อกัน
7 วัน	✓	✓	✓
3-4 วัน	✓	✓	✓
วิธีใช้	หยอดตา/จุ่ม	หยอดตา/จุ่ม	หยอดตา/จุ่ม

ที่มา: สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

หมายเหตุ : - ให้ใช้วัคซีนหลอดลมอักเสบติดต่อกันและนิวคาสเซิลเชื้อเป็นสเตรนลาโซต้า หรือใช้วัคซีนรวมนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบติดต่อกัน อย่างไม่อย่างหนึ่งเท่านั้น  
- การฉีดวัคซีนนิวคาสเซิลเชื้อเป็นในไก่เนื้อที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป(EU) ต้องมีระยะหยุดการใช้วัคซีนก่อนเข้าโรงฆ่า 30 วัน

## โปรแกรมการใช้วัคซีนป้องกันโรคในสุกร

อายุ	วัคซีนที่ใช้	
	โรคปากและเท้าเปื่อย	อหิวาต์สุกร
6 สัปดาห์		✓
8 สัปดาห์	✓	
12 สัปดาห์	✓	✓
ทุกๆ 6 เดือน	✓	
ทุกๆปี		✓
วิธีใช้	ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ	ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ/ใต้ผิวหนัง

ที่มา: สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์