



สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพาน

จังหวัดเชียงราย โทร./โทรสาร 0-5372-1913

E-mail amp5705@dld.go.th



ลำดับข่าวที่ 17/2555

มารู้จัก “วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยในโค – กระบือ” กันเถอะ !!!

ตามนโยบายกรมปศุสัตว์ เน้นให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม และ พฤษภาคม – มิถุนายน โดยให้เจ้าของสัตว์ เป็นผู้ดำเนินการฉีดวัคซีนด้วยตนเอง โดยอยู่ในความผิดชอบระหว่างสหกรณ์โคนมเชียงรายจำกัดและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพาน

ดังนั้น เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม มีความเข้าใจสามารถใช้วัคซีนให้มีประสิทธิภาพ จึงขอแนะนำให้รู้จักและ การใช้วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย สำหรับโค กระบือ ดังนี้.-

วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย สำหรับโค กระบือ แพะ แกะ



เป็นวัคซีนเชื้อตายชนิดน้ำ (Aqueous vaccine) ผลิตจากเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย ซึ่งเตรียมจาก เซลล์เพาะเลี้ยงทำให้เข้มข้น บริสุทธิ์ และทำให้หมดฤทธิ์ ด้วยสาร Binary Ethylene Imine (BEI)

สรรพคุณ: ใช้ฉีดป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยสำหรับ โค กระบือ แพะ แกะ

ส่วนประกอบ : วัคซีน 1 โด๊ส (2 มล.) ประกอบด้วยเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยไทป์ โอ เอ และเอเซียวัน แต่ละไทป์ไม่น้อยกว่า 10^7 TCID₅₀

วิธีการใช้ :

1. ฉีดวัคซีนครั้งแรกตั้งแต่อายุ 4 เดือน ถึง 6 เดือน
2. ฉีดครั้งที่ 2 หลังจากฉีดครั้งแรก 3-4 สัปดาห์ และฉีดซ้ำทุก 6 เดือน
3. ในกรณีที่เกิดโรคระบาด ให้ฉีดวัคซีนซ้ำทันที ทุกตัว

ขนาดฉีด : ตัวละ 2 มล. เข้าใต้ผิวหนัง

ความคุ้มโรค : สัตว์จะมีความคุ้มโรคหลังจากฉีดวัคซีน 3-4 สัปดาห์ และอยู่ได้นาน 6 เดือน

การเก็บรักษา : เก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง

ขนาดบรรจุ : ขวดละ 150 มล. (75 โด๊ส) หรือ ขวดละ 40 มล. (20 โด๊ส)

ข้อควรระวัง : อาจเกิดอักเสบตรงบริเวณที่ฉีดวัคซีน ร่วมกับมีไข้เล็กน้อย และเบื่ออาหาร แต่ไม่เป็นอันตราย