



กรมปศุสัตว์ เร่งดำเนินการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า แก้ปัญหาสุนัขจรจัด ลดปัญหาการแพร่โรคสู่ปศุสัตว์

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยประเด็นโคติดเชื้อพิษสุนัขบ้า เกิดจากสาเหตุถูกสุนัขกัดซึ่งยังไม่พบรายงานการแพร่ระบาดจากโคสู่โคร่วมฝูงหรือสู่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ มีมาตรการเร่งรัดในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในทุกพื้นที่ที่เกิดโรค และอบรมให้ความรู้ด้านโรคพิษสุนัขบ้าแก่คนในพื้นที่ รวมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจรจัดเพื่อควบคุมประชากร

นายสัตวแพทย์บุญญฤกษ์ ปิ่นประสงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ปัญหาการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าที่มีการแพร่โรคในกลุ่มโคกระบือในประเทศไทยว่า ปัจจุบันโรคพิษสุนัขบ้าพบการระบาดในบางพื้นที่ และพบมากในกลุ่มสุนัขจรจัด โดยจากข้อมูลการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าย้อนหลัง 5 ปี พบการติดเชื้อในโคกระบือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 26 ตัวต่อปี หรือร้อยละ 10 – 15 ของจำนวนสัตว์ที่พบติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าทั้งหมดในประเทศไทย และมีสาเหตุการติดเชื้อมาจากการถูกสุนัขกัด ซึ่งพบมากในแถบทางภาคอีสานและทางใต้ของประเทศไทย โดยยังไม่พบการรายงานการแพร่ระบาดจากโคสู่โคร่วมฝูงหรือสู่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ซึ่งองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ระบุว่า กรณีที่มีการรับประทานเนื้อโคที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่ทำให้สุก มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งหากมีการบริโภคเนื้อวัวดังกล่าว แนะนำให้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แต่อย่างไรก็ตาม โอกาสที่จะติดเชื้อจากการสัมผัสหรือบริโภคเนื้อวัวดิบถือว่าค่อนข้างน้อยมาก

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์ ได้มีมาตรการเร่งรัดในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในทุกพื้นที่ที่เกิดโรค โดยทุกครั้งที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า กรมปศุสัตว์ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องจะเร่งลงพื้นที่สอบสวนโรค ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขแมวจรจัดเกิดโรคให้ครอบคลุมทุกตัวในพื้นที่ ค้นหาโรคและติดตามหาคน/สัตว์ถูกกัดหรือสัมผัสเชื้อในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค กักสัตว์ถูกกัดหรือสัมผัสเชื้อ (รวมไปถึงโคกระบือในฝูงที่พบโรค) เพื่อดูอาการเป็นระยะเวลา 15 วัน พร้อมฉีดวัคซีน จับสุนัขจรจัดที่มีโอกาสเป็นแหล่งรังโรคในพื้นที่มาทำคอกดูอาการ พร้อมทำหมันและฉีดวัคซีนเพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้อในพื้นที่ ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ตามพรบ.โรคระบาดสัตว์เป็นระยะเวลา 30 วัน เฝ้าระวังโรคในพื้นที่ต่อเนื่องนาน 6 เดือน และอบรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านโรคพิษสุนัขบ้าแก่คนในพื้นที่ ซึ่งกรณีที่มีความจำเป็นต้องส่งทำลายปศุสัตว์กลุ่มเสี่ยงที่สงสัยโรคพิษสุนัขบ้า ตามพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ สามารถให้เงินชดเชยให้แก่เกษตรกรได้ 3 ใน 4 ของราคาสัตว์ นอกจากนี้ ยังได้บูรณาการแก้ไขปัญหาสุนัขแมวจรจัดอย่างต่อเนื่อง โดยการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขแมวให้ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 80 เป็นประจำทุกปี และประสานการดำเนินงานเพื่อการศึกษาวิจัยและบริหารจัดการสุนัขจรจัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบแก่ประชาชน เพื่อมุ่งเน้นการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์อย่างยั่งยืนและลดผลกระทบในการเกิดโรคในกลุ่มปศุสัตว์

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นสุนัข แมว หรือปศุสัตว์ แสดงอาการสงสัยโรคพิษสุนัขบ้า สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่อาสาปศุสัตว์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225-6888 หรือแอปพลิเคชัน DLD 4.0 เพื่อให้เข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่างส่งตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ และเข้าดำเนินการควบคุมโรคได้ทันที./